

- Atrae y mata moscas domésticas
- Doble acción
- Contiene NyGuard® IGR
- Para uso en interiores y exteriores
- Tres prácticos métodos de aplicación

#### INGREDIENTES ACTIVOS:

Clotianidina .....	0.50%
Piriproxifeno.....	0.05%
OTROS INGREDIENTES .....	99.45%
	100.00%

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## PRECAUCIÓN

Consulte las declaraciones de primeros auxilios y precaución en el interior.

### INSTRUCCIONES DE USO

Es una infracción a las leyes federales (EE. UU.) usar este producto de manera contraria a las instrucciones de la etiqueta.

**LEA TODA LA ETIQUETA. USE ESTRICTAMENTE DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN, LAS INSTRUCCIONES DEL USO Y LOS REGLAMENTOS ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDIENTES.**

#### RESTRICCIONES DE USO

- **NO ESTÁ REGISTRADO PARA LA VENTA, LA DISTRIBUCIÓN NI EL USO EN EL ESTADO DE NUEVA YORK.**
- No coloque cebo en áreas accesibles a niños, mascotas o animales destinados a la producción de alimentos.
- No deje que el cebo entre en contacto con alimentos o agua.
- No aplique en el interior de estructuras residenciales, plantas procesadoras de alimentos, restaurantes u otros establecimientos comerciales sin estaciones de cebo.
- No coloque en zonas exteriores en las que los polinizadores busquen alimento.
- No aplique a equipo de ordeño.
- No reutilice los utensilios de medición para alimentos.

#### TASA DE USO:

6.3 onzas (178.6 g aproximadamente 1 taza) por 1,000 pies cuadrados (93 m<sup>2</sup>). Vuelva a aplicar cada 3 a 5 días o según se consuma el cebo.

#### DÓNDE APLICAR

##### Aplicación por dispersión

- Zonas exteriores alrededor de instalaciones de producción agrícola incluidos: pabellones de pollos de engorde, pabellones de pavos, pabellones de gallinas ponedoras enjauladas y sin enjaular, recintos de engorde de otras aves de corral (patos, codornices, etc.) y estructuras para albergar ganado como vacas lecheras, ganado vacuno, cerdos, búfalos, visones y caballerizas. Disperse el cebo en áreas inaccesibles a los animales. No coloque cebo en áreas accesibles a niños o mascotas.
- Zonas exteriores alrededor de instalaciones comerciales incluidos: pastelerías, plantas procesadoras de bebidas, contenedores de basura, perreras, muelles de carga, plantas procesadoras de carne y aves de corral, basureros, áreas de reciclaje, restaurantes, supermercados, bodegas e instalaciones de manejo de desechos. No coloque cebo en áreas accesibles a niños o mascotas.
- Aplicación en interiores en pasillos de pabellones de gallinas ponedoras enjauladas e instalaciones de visones.

##### Aplicación en estaciones de cebo

- Aplicaciones en interiores y exteriores en pabellones de pollos casa de engorde, pavos, gallinas ponedoras enjauladas y sin enjaular, granjas lecheras y salas de ordeño, recintos de confinamiento de cerdos, caballerizas y lugares para la cría de ganado, mascotas y otros animales (ovejas, cabras, camellos, búfalos, burros, conejos, ciervos, visones). Coloque las estaciones de cebo en áreas inaccesibles a niños, mascotas y animales.
- Zonas interiores y exteriores alrededor de instalaciones comerciales y residenciales incluidos: pastelerías, plantas procesadoras de bebidas, contenedores de basura, canchas de golf, perreras, muelles de carga, plantas procesadoras de carne y aves de corral, basureros, áreas de reciclaje, restaurantes, supermercados, bodegas e instalaciones de manejo de desechos. Coloque las estaciones de cebo en áreas inaccesibles a niños, mascotas y animales.

#### Aplicaciones mediante brocha o pulverización

- Para aplicaciones en zonas interiores y exteriores alrededor de: pabellones de pollos casa de engorde, pabellones de pavos, pabellones de gallinas ponedoras enjauladas y sin enjaular, recintos de engorde de otras aves de corral (patos, codornices, etc.) y estructuras para albergar ganado como vacas lecheras, ganado vacuno, cerdos, búfalos, visones y caballerizas. No aplique en áreas accesibles a niños o mascotas.
- Zonas exteriores de instalaciones, edificios comerciales e industriales incluidos: pastelerías, plantas procesadoras de bebidas, contenedores de basura, perreras, muelles de carga, plantas procesadoras de carne y aves de corral, basureros, áreas de reciclaje, restaurantes, supermercados, bodegas e instalaciones de manejo de desechos. Aplique en áreas discretas para evitar que el cebo manche superficies visibles. No aplique en áreas accesibles a niños o mascotas.

#### CÓMO APLICAR:

Aplique el cebo donde se congregan las moscas. No coloque en lugares fríos o ventosos ya porque las moscas prefieren sitios cálidos para descansar.

Aplique al inicio de la temporada antes de que la población de moscas alcance su apogeo.

- Aplicación por dispersión: Disperse el cebo a 6.3 onzas (178.6 g aproximadamente 1 taza) por 1,000 pies cuadrados (93 m<sup>2</sup>) (no apile) en superficies niveladas y secas. Vuelva a aplicar una vez que las moscas hayan consumido el cebo. No aplique en superficies polvorosas. Disperse el cebo en áreas inaccesibles a niños, mascotas y animales.
- Aplicación en estaciones de cebo: Agregue 1.6 onzas (45.4 g aproximadamente 4 cucharadas) de cebo en estaciones de cebo comercialmente disponibles y coloque las estaciones en lugares en los que se congregan las moscas. Cada estación debe controlar aproximadamente 250 pies cuadrados (23 m<sup>2</sup>). Coloque las estaciones al menos cuatro pies (1.20 m) sobre el suelo. Coloque las estaciones de cebo en áreas inaccesibles a niños, mascotas y animales.
- Aplicaciones mediante brocha o pulverización: A fin de preparar el cebo para aplicación mediante pulverización o brocha, mezcle 1.6 onzas (45.4 g aproximadamente 4 cucharadas) de cebo para moscas con agua tibia hasta que se logre la consistencia deseada (típicamente 1-4 onzas [30-120 ml] de agua). Mezcle bien y deje reposar hasta que el cebo se haya disuelto completamente. La mezcla de cebo se puede aplicar mediante una brocha o botella pulverizadora estándar en lugares donde descansan las moscas (por ejemplo, paredes, vigas, alféizares, artefactos de iluminación en establos). Adicionalmente, se puede aplicar sobre tiras delgadas de arpillera, hojas de cartón o tela y colgar en áreas inaccesibles a mascotas y niños. El cebo debe tratar aproximadamente 250 pies cuadrados (23 m<sup>2</sup>). Limpie la brocha o botella pulverizadora con agua caliente después del uso. Trate superficies inaccesibles a niños, mascotas y animales.
- Recabado: Vuelva a aplicar cebo en 3 a 5 días o cuando se haya consumido el cebo.

#### PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS USE COMO PARTE DE UN PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE PLAGAS

- Siga los procedimientos adecuados de higiene y manejo de estiércol.
- Use controles ambientales como una adecuada gestión de la iluminación.

#### PARA EL USUARIO:

Si no puede leer bien el idioma en el que están redactadas estas instrucciones, no use el producto sino hasta que alguien le haya explicado bien toda la información contenida en esta etiqueta.

## PRIMEROS AUXILIOS

### CONTACTO CON LOS OJOS:

- Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos.
- Si usa lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando.
- Llame a un centro de toxicología o a un médico para obtener consejos de tratamiento.

**LÍNEA DIRECTA:** Tenga a mano el recipiente o la etiqueta del producto cuando llame al centro de toxicología o al médico, o concurra a tratamiento. Para obtener información sobre este producto (incluido temas de salud, emergencias médicas o incidentes relacionados con pesticidas), puede llamar al 1-888-740-8712.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

## PRECAUCIÓN

Causa irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

### EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Las personas que apliquen y manipulen este producto deben usar:

- Camisa manga larga
- Pantalones largos y
- Zapatos y calcetines.

Siga las instrucciones del fabricante sobre la limpieza y el mantenimiento del equipo de protección personal. Si no existen instrucciones de lavado, use detergente y agua caliente. Guarde y lave el equipo de protección personal separado de otra ropa.

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

Los usuarios deben:

- Lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o usar el baño.
- Sacarse inmediatamente la ropa si el pesticida la traspasa. Luego lavarse bien y colocarse ropa limpia.

### PELIGROS AMBIENTALES

Este producto es tóxico para invertebrados acuáticos. La deriva y el escurrimiento pueden ser peligrosos para organismos acuáticos en zonas aledañas. No aplique donde pueda producirse escurrimiento. No aplique directamente al agua o en áreas donde haya agua superficial, o en zonas intermareales que estén debajo de la marca de agua máxima media. No contamine el agua al limpiar el equipo o al desechar las aguas del lavado o enjuague del equipo.

Este producto es sumamente tóxico para las abejas y otros insectos polinizadores expuestos al tratamiento directo o a residuos en cosechas o malezas en flor. No aplique este producto si abejas u otros insectos polinizadores visitan el área de tratamiento.

### PELIGROS FÍSICOS O QUÍMICOS

No aplique este producto en o alrededor de equipo eléctrico debido al riesgo de descarga.

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine agua, alimentos ni pienso al almacenar o eliminar este producto.

### ALMACENAMIENTO DE PESTICIDA:

Mantenga este producto en su recipiente original herméticamente cerrado cuando no se esté utilizando. No almacene cerca de fuentes de calor o llamas abiertas. Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado (preferentemente cerrado) que sea inaccesible a niños y animales, y lejos de alimentos para personas y mascotas.

### ELIMINACIÓN DE PESTICIDA:

Para evitar desechos, utilice todo el material en este recipiente aplicándolo según las instrucciones de la etiqueta. Si es imposible usar todo el producto, entregue el producto restante a un centro de eliminación de desechos o programa de eliminación de pesticidas (frecuentemente tales programas son administrados por el estado o gobiernos locales o por la industria).

### ELIMINACIÓN DEL RECIPIENTE:

Recipiente no rellenable. No vuelva a utilizar ni llenar este recipiente. Enjuague tres veces (o su equivalente). Luego envíe a un centro de reciclaje, si hubiese uno disponible, o de reacondicionamiento, si corresponde, o elimine en un relleno sanitario o por otros medios aprobados por las autoridades estatales y locales.



N.º de registro de EPA: 1021-2803  
N.º de establecimiento de EPA: 1021-MN-2  
Rev. 0618a-0420



MGK®, NyGuard® y Decimari® son marcas registradas de McLaughlin Gormley King Company.  
Fabricado por MGK®. ©2020 MGK. Todos los derechos reservados.  
7325 Aspen Lane North, Minneapolis, MN 55428